



## Aanmeldingsformulier tandheelkundige ingrepen tijdens antitrombotische behandeling

### Toelichting

(gelieve de volledige toelichting te lezen)

### De tandarts:

1. Vult de gegevens van de patiënt in op bladzijde 2 en kruist het bloedingsrisico aan.
2. Door in Adobe Reader rechtsboven op  te klikken krijgen de invulbare velden een gekleurde achtergrond. Na het invullen klikt u op . Hierna wordt uw email programma geopend waarbij alle relevante items automatisch ingevuld worden, waarna u de mail direct kunt verzenden.
3. Het formulier dient tenminste 1 week vóór de ingreep naar de trombosedienst te worden verstuurd per beveiligde e-mail naar zelfcontrole@jbz.nl.

Voor spoedingrepen kunt u op werkdagen van 8.30-16.30 uur telefonisch overleggen met de trombosedienst: (073) 553 86 16  
Buiten de reguliere openingstijden kunt u overleggen met de dienstdoende arts van de trombosedienst. Bereikbaar via de telefooncentrale van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, (073) 553 20 00

### De trombosedienst:

1. Vult de overige gegevens in op bladzijde 3  
Bij continueren van de antistolling wordt de controle INR waarde ingevuld.  
Bij stoppen van de antistolling zal geen INR waarde ingevuld worden.  
Tevens wordt aangegeven of tijdens het tijdelijk stoppen wel of niet overbrugd zal worden met LMWH injecties (Low Molecular Weight Heparine)
2. Het ingevulde bestand wordt vervolgens per email geretourneerd aan de tandarts.

### De patiënt:

Maakt, in geval van INR controle, zelf met de trombosedienst een afspraak 1 tot 3 dagen voor de ingreep.

## Aanmeldingsformulier tandheelkundige ingrepen tijdens antitrombotische behandeling

### Invullen door de tandarts

Stuur dit ingevulde formulier tenminste 1 week vóór de ingreep middels bovenstaande verzendknop.

Bij continueren van de antistolling wordt de controle INR waarde per e-mail geretourneerd.

### Gegevens patiënt

Naam patiënt

Geboortedatum

BSN

Datum ingreep

### Gegevens tandarts

Naam tandarts

Adres

E-mail

Telefoon

Ingreep (aankruisen door tandarts)	Beleid Trombosedienst
<p>Ingreep met laag bloeding risico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mondhygiëne ingrepen</li> <li>• Extractie van 1 t/m 3 elementen</li> <li>• Operatieve verwijdering of operatieve wortelkanaalbehandeling van 1 gebitselement</li> <li>• Plaatsen van maximaal 3 implantaten (mits goede sluiting mogelijk is)</li> <li>• Abcesincisie, niet invasieve parodontale behandelingen</li> </ul>	<p>Antistolling van acenocoumarol / fenprocoumon <b>niet stoppen</b></p> <p>INR controle maximaal 1-3 dagen vóór de ingreep door de trombosedienst.</p> <p>De controle INR moet <math>\leq 3.5</math> zijn.</p>
<p>Ingreep met gemiddeld / hoog bloeding risico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extractie van &gt; 3 elementen</li> <li>• Operatieve verwijdering of operatieve wortelkanaalbehandeling van meerdere gebitselementen</li> <li>• Invasieve parodontale ingrepen</li> <li>• Hoog bloedingrisico-ingrepen</li> <li>• Andere redenen waarom het gewenst is de antistolling te staken</li> </ul>	<p>Antistolling van acenocoumarol / fenprocoumon <b>tijdelijk stoppen</b></p> <p>De trombosedienst-arts overlegt met de voorschrijver (indicatiesteller) van de antistolling of tijdelijk gestopt kan worden en of er overbrugd moet worden met Laag Moleculair Gewicht Heparine (LMWH) injecties. (Low Molecular Weight Heparine)</p> <p>Het stoppen, herstarten en eventueel overbruggen wordt geregeld door de trombosedienst.</p>

Bij niet stoppen van de antistolling worden de volgende aanbevelingen gedaan:

- na extractie wond hechten en eventueel aanbrengen van Surgycell
- minimaal 30 minuten wondcompressie
- na de ingreep voorzichtig spoelen met tranexaminezuur 5 % mondspoeling, 4 dd 10 cc, gedurende 5-7 dagen (recept van tandarts)
- patiënt mondeling en schriftelijk instructies geven over wat te doen bij een nabloeding

## Aanmeldingsformulier tandheelkundige ingrepen tijdens antitrombotische behandeling

### Gegevens patiënt

Naam patiënt

Geboortedatum

BSN

Datum ingreep

### Invullen door de trombosedienst

Antistolling van acenocoumarol / fenprocoumon **niet stoppen**

Controle INR

Datum:

Eventuele opmerking(en) / toelichting

Naam arts

Antistolling van acenocoumarol / fenprocoumon **tijdelijk stoppen**

Niet overbruggen met LMWH injecties

Overbruggen\* met LMWH injecties

Eventuele opmerking(en) / toelichting

Het stoppen, herstarten en eventueel overbruggen wordt geregeld door de trombosedienst.

Naam arts

\* Overbruggen is het gebruik van LMWH (Low Molecular Weight Heparine) injecties gedurende een periode van tijdelijk staken van de coumarines (acenocoumarol en fenprocoumon/Marcoumar®) tot de INR na de ingreep > 2.0 is. De avond vóór en de dag van de ingreep wordt geen LMWH gespoten.